

# Contribution à l'étude bactériologique d'entérobacters isolés chez le lièvre

---

THÈSE

présentée

à L'UNIVERSITÉ CLAUDE BERNARD de LYON  
(Médecine - Pharmacie)

et soutenue publiquement le 26 Janvier 1978  
pour obtenir le grade de Docteur Vétérinaire

par

DELUBAC André  
né le 1<sup>er</sup> Septembre 1951  
à CHARLIEU (Loire)





ÉCOLE NATIONALE VÉTÉRINAIRE DE LYON

Année 1912

1912

Contribution à l'étude bactériologique  
d'enterobactéries coliformes chez le cheval

Digitized by the Internet Archive  
in 2026

L'UNIVERSITÉ CLAUDE BERNARD DE LYON

CHIMIE ORGANIQUE

Le volume est déposé le 25 Janvier 1912

aux archives de l'école de Vétérinaire de Lyon

1912

DEAC 1912

1912-1913

1912-1913



# Contribution à l'étude bactériologique d'entérobacters isolés chez le lièvre

---

## THÈSE

présentée

à L'UNIVERSITÉ CLAUDE BERNARD de LYON

(Médecine - Pharmacie)

et soutenue publiquement le 26 Janvier 1978

pour obtenir le grade de Docteur Vétérinaire

par

DELUBAC André

né le 1<sup>er</sup> Septembre 1951

à CHARLIEU (Loire)



ASSOCIATION AMICALE  
DES ETUDIANTS EN PHARMACIE DE LYON  
UNIVERSITÉ CLAUDE BERNARD  
8, Avenue Rockefeller, 8  
69373 LYON Cedex 2

100



PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'ECOLE NATIONALE VETERINAIRE  
DE L Y O N

---

DIRECTEUR . . . . . Monsieur le Professeur FROGET

DIRECTEURS HONORAIRES . . . . . Messieurs les Professeurs TAPERNOUX, FLORIO.

PROFESSEURS

|                                                                                           |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1°) Pharmacie et Toxicologie . . . . .                                                    | M. LORGUE    |
| 2°) Anatomie descriptive - Extérieur - Anatomie appliquée . . . . .                       | M. BARONE    |
| 3°) Physiologie - Thérapeutique - Pharmacodynamie . . . . .                               | M. BOST      |
| 4°) Histologie - Embryologie - Anatomie Pathologique . . . . .                            | M. TISSEUR   |
| 5°) Hygiène et Industrie des Aliments d'Origine Animale . . . . .                         | M. FLACHAT   |
| 6°) Parasitologie et Maladies Parasitaires . . . . .                                      | M. EUZEBY    |
| 7°) Pathologie médicale des Equidés et des Carnivores - Législation Vétérinaire . . . . . | M. FONTAINE  |
| 8°) Pathologie médicale du Bétail et des Animaux de Basse-Cour . . . . .                  | M. COTTEREAU |
| 9°) Technique chirurgicale - Pathologie chirurgicale . . . . .                            | M. COULON    |
| 10°) Obstétrique - Pathologie de la reproduction . . . . .                                | M. BERTRAND  |
| 11°) Pathologie générale - Microbiologie - Immunologie . . . . .                          | M. OUDAR     |
| 12°) Ethnologie - Zootechnie - Economie Rurale . . . . .                                  | M. FROGET    |
| 13°) Botanique appliquée - Agronomie - Alimentation . . . . .                             | M. WOLTER    |
| 14°) Physique et Chimie biologiques et médicales . . . . .                                |              |
| 15°) Maladies contagieuses - Zoonoses - Législation sanitaire . . . . .                   | M. JOUBERT   |



PROFESSEURS SANS CHAIRE

MM. CHANTEGRELET, DELATOUR, DESCHANEL, JEAN-BLAIN, LAPRAS, LE NIHOUANNEN.

MAITRES DE CONFERENCES

MM. BOIVIN, GASTELLU, MOUTHON.

M. PRAVE, Mlle LAVAL.

MAITRES-ASSISTANTS AGREGES

MAITRES-ASSISTANTS

Mme CHAUVÉ, MM. FRANCK, FAU, GARNIER, GEVREY, GOUY, KECK, LABE, M. LEGEAY, Mme RACHAIL, M. RICHARD, M. EUZÉBY

ASSISTANTS

MM. BELLI, BESEAUD, CHEVRIER, Mlle COURSAT, MM. DEGUELLE, DEMONT, DESCOTES, Mlle FLEURY, GENIN, MOREAU, NEYRET, PERROTIN, Mme SIMONET, M. SOTTIAUX.

EXAMINATEURS DE LA THESE

PRESIDENT : M. le Professeur BERTOYE de la Faculté de Médecine

PREMIER ASSESSEUR : M. le Professeur OUDAR de l'Ecole Nationale Vétérinaire

DEUXIEME ASSESSEUR : M. le Professeur JOUBERT de l'Ecole Nationale Vétérinaire

---

L'Université Claude Bernard (Médecine-Pharmacie) de LYON et l'Ecole Nationale Vétérinaire de LYON déclarent que les opinions émises dans les dissertations qui leur sont présentées doivent être considérées comme propres à leurs auteurs et qu'elles n'entendent leur donner ni approbation ni improbation.



A MA FEMME,

A MA FILLE,

A MES PARENTS,

*qui m'ont constamment soutenu et aidé dans  
mes études.*

*Qu'ils trouvent ici un témoignage de ma  
reconnaissance et de mon affection.*



A MESSIEURS LES MEMBRES DE NOTRE JURY

Monsieur le Professeur BERTOYE,

*qui nous a fait l'honneur d'accepter la présidence  
du jury de notre thèse.*

*Hommages respectueux.*

Monsieur le Professeur OUDAR,  
de l'Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon,

*qui nous a donné les moyens de réaliser ce travail.*

*Qu'il accepte nos remerciements pour l'aide dont  
il nous a fait bénéficier.*

Monsieur le Professeur JOUBERT  
de l'Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon

*qui a bien voulu faire partie de notre jury de thèse.*



A Monsieur Y. RICHARD

Maître-Assistant à l'Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon

*En lui exprimant toute notre gratitude pour  
l'aide précieuse, compétente et de tous les  
instants qu'il nous a apportée.*

Nous remercions également :

Le Personnel du Service de Pathologie Générale de  
l'Ecole Vétérinaire

*qui nous a toujours prêté l'aide nécessaire  
à la réalisation matérielle de ce travail.*



I N T R O D U C T I O N  
-:-:-:-:-



Depuis plusieurs années, nous assistons à un dépeuplement progressif des terrains de chasse malgré les fréquents lâchers de gibier opérés par les Fédérations de Chasseurs.

Sont évoquées, comme causes principales pour expliquer cette régression :

- 1) Les méthodes modernes de l'agriculture qui s'appuient sur des techniques qui modifient le biotope naturel du gibier,
- 2) Les conditions météorologiques,
- 3) Une pression de chasse augmentée.

En conséquence, le lièvre disparaît peu à peu de nos campagnes.

Pour essayer d'enrayer ce processus et de maintenir le cheptel en léporidés des territoires de chasse, deux solutions peuvent être envisagées :

- soit une action sur le milieu en collaboration étroite avec les agriculteurs, conduisant à envisager comme solution d'avenir l'aménagement du territoire cynégétique,
- soit un repeuplement avec des animaux d'élevage ou avec des animaux sauvages généralement importés.

La solution actuellement retenue est l'importation des pays de l'Est. Cependant, depuis quelques années, des élevages de lièvres parfois très importants sont apparus. Mais l'installation, puis la conduite de tels élevages, se heurtent à de nombreuses difficultés :

- un coût élevé,
- une adaptation difficile des animaux dans un territoire, lors des lâchers dans la nature.



Le développement des maladies souvent mortelles demeure la préoccupation majeure des éleveurs.

En dehors des infestations parasitaires relativement aisées à prévenir ou à traiter, la pathologie du lièvre est souvent dominée par les maladies infectieuses dont les agents responsables sont très divers et appartiennent fréquemment à la famille des Enterobacteriaceae.

La famille des Enterobacteriaceae est très vaste. Elle comprend des bacilles gram négatifs, mobiles le plus souvent, qui cultivent aisément sur les milieux ordinaires et attaquent les glucides en produisant ou non du gaz. Elles possèdent une nitrate réductase et sont dépourvues d'oxydase.

Si le rôle pathogène de certaines de ces bactéries, comme *Escherichia coli*, *Salmonella*, *Klebsiella*, voire *Proteus*, est reconnu, il n'en est pas de même pour d'autres genres comme les *Enterobacter*.

Il nous a semblé opportun d'approfondir, d'une part l'étude bactériologique, d'autre part, le pouvoir pathogène expérimental de ce microorganisme. En effet, il est devenu classique d'isoler de plus en plus fréquemment ces bactéries lors de cas de mortalité chez le lièvre.

Dans ce but, les souches d'*Enterobacter* isolées ont été soumises à un certain nombre de tests destinés à préciser leurs caractères morphologiques, culturels et biochimiques.

Dans une première partie, nous rappellerons les données actuelles bactériologiques de ce genre.

Dans une deuxième partie, nous nous proposons d'établir les caractères morphologiques, culturels, biochimiques, le pouvoir pathogène de quarante souches isolées chez le lièvre.

Puis, nous discuterons de l'antibiosensibilité et du pouvoir pathogène de ces souches.



## PREMIERE PARTIE

-:-:-:-:-:-:-:-

## LE GENRE ENTEROBACTER

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-



## I. HISTORIQUE (5)

-----

En 1900, BEIJERINCK décrit le genre *Aerobacter*, bactérie mobile et immobile pouvant cultiver à une température inférieure à 37° C.

CASTELLANI et CHALMERS, en 1919, en séparent le genre *Cloaca* qui liquéfie lentement la gélatine.

HORMAECHE et EDWARDS complètent la description de ce genre en retenant le nom de *Aerobacter*, d'où confusion ; si bien que plus tard, en 1960, ils donnèrent à ce genre le nom de *Enterobacter*.

En 1963, le nom de genre *Enterobacter* de HORMAECHE et EDWARDS remplaça le nom de genre *Cloaca* de CASTELLANI et CHALMERS.

SAKAZAKI en 1961 et EWING en 1963 suggérèrent d'inclure le genre *Hafnia* au genre *Enterobacter* et l'appelèrent *Enterobacter alvei*. Actuellement, on a tendance à remplacer la dénomination *Enterobacter alvei* par *Enterobacter hafniae*.

Ainsi, actuellement, on distingue quatre espèces :

- *Enterobacter cloacae* de HORMAECHE et EDWARDS en 1960, qui correspond à :

- . *Bacillus cloacae* de JORDAN (1890)
- . *Bacterium cloacae* de LEHMANN et NEWMANN (1896)
- . *Cloaca cloacae* de CASTELLANI et CHALMERS
- . *Aerobacter cloacae* de HORMAECHE et EDWARDS (1958).

- *Enterobacter aerogenes* de HORMAECHE et EDWARDS en 1960, qui correspond à :

- . *Bacillus aerogenes* de MILLER (1896)
- . *Bacterium aerogenes* de CHESTER (1897)
- . *Aerobacter aerogenes* de BEIJERINCK (1900)
- . *Aerobacter aerogenes* de HORMAECHE et EDWARDS (1958).



- Enterobacter liquefaciens que BASCOMB et EWING considèrent comme une espèce non pigmentée de *Serratia*. Il correspond à :

- . *Aerobacter liquefaciens* de GRIMES et HENNERTY (1931)
- . *Aerobacter lipolyticum*.

- Enterobacter hafniae de SAKAZAKI (1961) et EWING (1963) qui correspond à :

- . *Bacillus paratyphus-alvei* de BAHR (1919) ; dénomination qui indique son pouvoir pathogène pour les abeilles.
- . *Paracolon aerobacter* ou *Paracolonobacterium aerogenoïdes* de STUART
- . *Hafnia* (du nom Viking de Copenhague) *alvei* de MOELLER (1954)
- . *Aerobacter aerogenes*
- . *Enterobacter aerogenes* subsp. *hafniae* de EWING (1963).

N.B. : Une bactérie phytopathogène, *Erwinia herbicola*, peut être considérée comme une espèce d'*Enterobacter*. Il s'agit d'*Enterobacter agglomerans* (24) de EWING.






TABLEAU I : Historique du genre Enterobacter.



## II. TAXONOMIE.

-----

D'après la systématique et la taxonomie de PREVOT, les Enterobacter appartiennent :

- à l'embranchement des Schizomycètes, singulier par son absence de sexualité et de noyau défini,

- au sous-embranchement des Eubacteria, bactéries vraies, simples, non différenciées, sans ramifications vraies,

- à la classe des Asporulales,

- à l'ordre des Bactériaes, de forme allongée et droite,

- à la famille des Enterobacteriaceae, bacilles Gram négatifs, anaérobies facultatifs, qui cultivent aisément sur les milieux ordinaires, qui fermentent rapidement le glucose avec formation d'acides et parfois de gaz, qui réduisent les nitrates en nitrites et ne possèdent pas d'oxydase.

Cette famille définie en 1958 par le sous-comité de l'Association Internationale des Microbiologistes a été subdivisée par EDWARDS et EWING en quatre sous-familles sur la base de leurs affinités biochimiques (57).  
(Tableau II).

| <u>1</u>    | <u>2</u>    | <u>3</u>     | <u>4</u>    |
|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Salmonella  | Escherichia | Klebsiella   | Proteus     |
| Arizona     | Shigella    | Enterobacter | Providencia |
| Citrobacter |             | Serratia     |             |

Cette classification s'est augmentée en 1965 du genre Edwarsiella (26) qui présente des caractères similaires avec Salmonella ; en 1971, du genre Levinea qui partage de nombreux points communs avec Escherichia. Enfin, très récemment, le genre Yersinia a été introduit dans la famille des Enterobactéries.



Le genre *Enterobacter* est subdivisé en cinq espèces :

- *Enterobacter cloacae*,
- *Enterobacter aerogenes*,
- *Enterobacter liquefaciens*,
- *Enterobacter hafniae*,
- *Enterobacter agglomerans*.



|                           | GROUPE<br>I                          | GROUPE<br>II            | GROUPE<br>III                         | GROUPE<br>IV           |
|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|                           | Salmonella<br>Arizona<br>Citrobacter | Shigella<br>Escherichia | Klebsiella<br>Enterobact.<br>Serratia | Proteus<br>Providencia |
| Mobilitéé                 | + + +                                | - +                     | - + +                                 | + +                    |
| Gaz en glucose            | + + +                                | - +                     | + + d                                 | + d                    |
| Lactose                   | - + +                                | - +                     | + + -                                 | - -                    |
| $\beta$ galactosidase     | - d +                                | d +                     | + + +                                 | - -                    |
| H <sub>2</sub> S          | + + +                                | - -                     | - - -                                 | d -                    |
| Uréase                    | - - -                                | - -                     | - - -                                 | + -                    |
| Tryptophane<br>désaminase | - - -                                | - -                     | - - -                                 | + +                    |
| Indole                    | - - -                                | d +                     | - - -                                 | d +                    |
| Lysine<br>decarboxylase   | + + -                                | - -                     | d d +                                 | - -                    |
| Citrate                   | + + +                                | - -                     | + + +                                 | d +                    |
| Gelatine                  | - - -                                | - -                     | - d +                                 | d -                    |
| Culture en KCN            | - - +                                | - -                     | + + +                                 | + +                    |
| Mannitol                  | + + +                                | d +                     | + + +                                 | - d                    |
| Adonitol                  | - - -                                | - -                     | + d d                                 | - d                    |
| Saccharose                | - - d                                | - -                     | + + +                                 | d d                    |
| Salicine                  | - - d                                | - d                     | + + +                                 | d -                    |
| Inositol                  | d - -                                | - -                     | + d d                                 | - d                    |
| Dulcitol                  | d - d                                | d d                     | d - -                                 | - -                    |
| Rouge de méthyle          | + + +                                | + +                     | - - -                                 | + +                    |
| Vosges Proskauer          | - - -                                | - -                     | + + +                                 | - -                    |
| Malonate                  | - + -                                | - -                     | + d -                                 | - -                    |

TABLEAU II

Caractères biochimiques des Enterobactéries.



### III. CARACTERES BACTERIOLOGIQUES.

-----

#### 1) Morphologie et coloration :

Petits bacilles Gram - trapus de 2 à 3  $\mu$  sur 0,5  $\mu$  à extrémité arrondie, les Enterobacter sont mobiles par ciliature pérित्रiche, non capsulés, non sporulés.

#### 2) Culture :

Anaérobies facultatifs, ils cultivent facilement sur les milieux usuels :

- sur gélose ordinaire : les colonies sont brillantes, opaques, souvent d'aspect assez gras,
- en bouillon : un trouble homogène avec ondes moirées traduit la multiplication bactérienne.

Cependant, tous les auteurs ont souligné l'influence de la température sur les activités enzymatiques métaboliques et physiologiques de Enterobacter hafniae. Elles sont nettement plus intenses à 22° C qu'à 37° C.

### IV. CARACTERES BIOCHIMIQUES.

-----

#### 1) Communs :

|                       |   |  |                  |   |       |
|-----------------------|---|--|------------------|---|-------|
| Glucose               | ) |  | Indole           | ) |       |
| Lactose <sup>+</sup>  | ) |  | RM               | ) |       |
| $\beta$ galactosidase | ) |  | H <sub>2</sub> S | ) | _____ |
| Saccharose            | ) |  | Uréease          | ) |       |
| Mannitol              | ) |  |                  |   |       |
| Salicine              | ) |  |                  |   |       |
| Citrate               | ) |  |                  |   |       |
| (Simmons)             | ) |  |                  |   |       |
| VP                    | ) |  |                  |   |       |
| KCN                   | ) |  |                  |   |       |

+-----+  
 + Variantes : lactose - ,  $\beta$  galactosidase +



2) Différentiels :

| Espèces<br>Réactions<br>biochimiques | E.      | E.        | E.           | E.             | E.          |
|--------------------------------------|---------|-----------|--------------|----------------|-------------|
|                                      | cloacae | aerogenes | liquefaciens | hafniae        | agglomerans |
| Mobilité                             | +       | +         | +            | + 22°<br>- 37° | +           |
| Citrate                              | +       | +         | +            | d 22°<br>- 37° | +           |
| Lysine<br>décarboxylase              | -       | +         | +            | +              | -           |
| Gaz en<br>inositol                   | -       | +         | +            | -              | -           |
| Gaz en<br>glycérol                   | -       | +         | +            | +              | -           |
| Rhamnose                             | +       | +         | -            | +              | +           |
| Sorbitol                             | +       | +         | +            | -              | ±           |
| Gélatinase                           | +       | -         | ±            | -              | +           |
| Ornithine<br>décarboxylase           | +       | +         | +            | +              | -           |
| Arginine<br>dihydrolase              | +       | -         | -            | -              | -           |
| Lipase et<br>DNase                   | -       | -         | +            | -              | -           |
| Lyse par phage<br>Hafnia             | -       | -         | -            | +              | -           |

TABLEAU IIICaractères biochimiques différentiels des Enterobacter (57) (46)



Selon RICHARD C. (67), cette classification fondée uniquement sur les caractères biochimiques n'est pas satisfaisante. En particulier, *Enterobacter liquefaciens* (DNase +, lipase +) sont en réalité très proches des *Serratia* et n'en constitueraient qu'un biotype.

#### V. PROPRIETES BIOLOGIQUES.

-----

##### 1) Habitat et rôle pathogène :

Fréquemment rencontrés dans le sol, les eaux usées, les eaux de surface, les légumes, les produits de laiterie, les *Enterobacter* sont des commensaux du tube digestif de l'homme et des animaux. Ils sont également isolés lors de pyélonéphrites, pleurésies, méningites... (57). Il est cependant difficile de se prononcer sur leur pouvoir pathogène.

Bien que certaines souches d'*Enterobacter hafniae* puissent provoquer la dilatation de l'anse ligaturée d'intestin de lapin selon la technique de DE et CHATTERJE (12), la plupart des auteurs considèrent que cette bactérie ne joue aucun rôle pathogène dans l'étiologie des maladies intestinales de l'homme. En revanche, sa pathogénicité semble probable pour les abeilles.

En ce qui concerne les autres espèces d'*Enterobacter*, les renseignements demeurent très fragmentaires.

##### 2) Pouvoir antigène :

La structure antigénique de *Enterobacter cloacae* est mal connue. 53 antigènes O et 56 antigènes H ont été déterminés par les Japonais (73).

En ce qui concerne *Enterobacter hafniae*, SAKAZAKI, en examinant 294 cultures, a pu mettre en évidence 29 groupes O et 23 antigènes H correspondant à 51 sérotypes différents (73). Il a montré également le caractère monophasique des antigènes H de *Enterobacter hafniae* et la présence éventuelle d'un antigène K muqueux (slime) chez certaines souches. Enfin, il a trouvé qu'il existait des relations antigéniques O entre *Enterobacter hafniae* d'une part et *Enterobacter cloacae*, *Klebsiella*, *Escherichia coli* et *Salmonella* d'autre part (73).



MATSUMOTO (48) a complété ce travail et a pu individualiser 51 antigènes O et 27 antigènes H, ce qui lui a permis de distribuer, selon 144 sérotypes différents, 327 souches isolées par coproculture. Selon cet auteur, il n'existerait pas de sérotype de *Enterobacter hafniae* entéropathogène (48).

Sans les rechercher systématiquement, RICHARD et ALONSO (71) ont trouvé des communautés antigéniques O entre certaines souches de *Enterobacter hafniae* et les facteurs 0:1, 0:6, 0:10, 0:13, 0:15, 0:22, 0:38 de *Salmonella* et entre d'autres souches de *Enterobacter hafniae* et *Yersinia enterocolitica* sérotype 0:10, K1.

### 3) Lysotypie :

GUINEE et VALKENBURG ont isolé en 1968 d'un échantillon d'eau de surface un phage qu'ils ont propagé sur une souche de *Enterobacter hafniae* (32). Ces auteurs, en recherchant la lyse obtenue par l'action de ce phage sur les cultures de différentes espèces d'entérobactéries, ont trouvé qu'il était spécifique de l'espèce *Enterobacter hafniae*. Ce phage n'est pas inactivé par un chauffage à 60° pendant trente minutes.

La valeur diagnostique de ce phage a été confirmée par SANCHEZ-BUENAVENTURA et GARCIA-SABATER (75). Sa spécificité a un grand intérêt. Toutefois, 4 % des cultures de *Enterobacter hafniae* réalisées par RICHARD et ALONSO (71) n'ont pas été lysées par ce phage, ni à 37° C ni à 22° C.

### 4) Bactériocines :

HAMON et PERON ont trouvé que 30 % des *Enterobacter hafniae* qu'ils avaient étudiés, produisaient des bactériocines, apparentées aux colicines, mais suffisamment individualisées pour constituer une famille d'entérobactériocines qu'ils ont dénommées "alvéïcines" (35).



DEUXIEME PARTIE

-:~::~:~::~:~::~:~::~:~::~:-

ESSAIS DE DETERMINATION DES CARACTERES MORPHOLOGIQUES,  
CULTURAUX, BIOCHIMIQUES ET DU POUVOIR PATHOGENE  
DE DIFFERENTES SOUCHES D'ENTEROBACTER ISOLEES CHEZ LE LIEVRE.

~::~:~::~:~::~:~::~:~::~:-



## I. MATERIEL ET METHODES.

-----

### 1) Souches étudiées :

Quarante souches d'*Enterobacter* ont été isolées du contenu intestinal et des viscères, soit de levrauts d'élevage après sevrage (cinq souches), soit de lièvres autochtones et d'importation (trente cinq souches).

(Tableaux IV et V).

### 2) Isolement :

Toutes les souches d'*Enterobacter* testées ont été isolées à partir d'animaux vivants ou de cadavres en parfait état de conservation.

Pour vingt sept animaux, trois viscères (foie, rate, sang du coeur) et le contenu intestinal, ont été systématiquement ensemencés.

Au total, quarante souches d'*Enterobacter*, dont trente *cloacae* et dix *hafniae*, ont été étudiées.

Les isolements ont été obtenus sur les milieux suivants :

- milieu à l'éosine bleu de méthylène (E.M.B.)
- milieu de DRIGALSKI
- gélose ordinaire
- gélose au sang.

### 3) Etude morphologique :

Les propriétés tinctoriales ainsi que la morphologie des bactéries isolées sont contrôlées suivant la technique classique du Gram ; la mobilité sera vérifiée par un examen à l'état frais.



| N° de l'animal | Sexe        | Parasitologie                                 | Bactériologie                                                                                    | Symptômes et lésions                                                                         |
|----------------|-------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 75 199         | M           | Strongylose                                   | E. cloacae associé à flore multiple                                                              | Lièvre de terrain<br>Conjonctivite bilatérale                                                |
| 76 643         | M           | Coccidiose<br>Strongylose                     | E. cloacae dans foie et rate.<br>Staphylocoque non pathogène.<br>E. coli.<br>Bacille hémolytique | Lièvre d'élevage.<br>Intestin hémorragique<br>Diarrhée                                       |
| 74 644         | F           | Néant                                         | E. cloacae dans rein et<br>poumon associé à E. coli et à<br>staphylocoque dans fèces.            | Pneumonie. Pleurésie<br>Intestin hémorragique<br>Splénomégalie                               |
| 73 566         | F           | Trichinose<br>Trichostrongylose<br>Coccidiose | E. cloacae pur dans rein,<br>foie et fèces                                                       | Intestin congestionné<br>Dépôts d'urate<br>Diarrhée                                          |
| 74 692         | F<br>Pleine | Néant                                         | E. cloacae associé à une<br>flore multiple dans ovaires<br>et foie                               | Diarrhée hémorragique<br>Rate et foie congestionnés<br>Poumon ayant des nodules<br>blancs    |
| 74 695         | F<br>Pleine | Néant                                         | E. cloacae dans rein, foie<br>et fèces                                                           | Diarrhée<br>Ulcères stomacaux                                                                |
| 74 715         | M           | Néant                                         | E. cloacae + E. coli<br>dans les surrénales                                                      | Lièvre de terrain<br>Ictère<br>Hémorragie : pétéchies<br>sur l'intestin<br>Foie dégénéré     |
| 74 717         | M           | Trichostrongylose                             | E. cloacae + E. coli +<br>enterocoque dans pus de<br>l'oeil                                      | Lièvre de terrain trouvé<br>mort<br>Kerato-conjonctivite<br>purulente<br>Gaz dans l'intestin |



| N° de l'animal      | Sexe    | Parasitologie                             | Bactériologie                                                           | Symptômes et lésions                                                                           |
|---------------------|---------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 74 718              | M       | Néant                                     | E. cloacae dans jetage                                                  | Coryza                                                                                         |
| 74 682              | F       | Néant                                     | E. cloacae dans rate                                                    | Diarrhée<br>Utérus congestionné, dilaté<br>→ avortement<br>Ovaires avec nodules                |
| 1 051 (1)           | Levraut |                                           | E. cloacae dans rate                                                    | Septicémie                                                                                     |
| 1 051 (2)           | Levraut |                                           | E. cloacae dans rate                                                    | Septicémie                                                                                     |
| H12 891             | F       |                                           | E. cloacae dans fèces                                                   | Hase stérile                                                                                   |
| 74 734              | M       | Néant                                     | E. cloacae + E. coli +<br>Pasteurella hemolytica<br>dans foie et poumon | Splénomégalie<br>Poumon gris jaune                                                             |
| 74 736              | M       | Trichostrongylose<br>Coccidiose<br>légère | E. cloacae + E. coli<br>dans os, fèces, foie                            | Intestin congestionné et<br>hémorragique<br>Splénomégalie, péritonite<br>Poumons congestionnés |
| 74 737              | M       | Coccidiose<br>légère                      | E. cloacae + Klebsiella<br>dans os, foie, rate,<br>fèces                | Surcharge graisseuse<br>Foie congestionné<br>Intestin dilaté et<br>hémorragique                |
| 74 740<br>N° 69 983 | M       | Coccidiose<br>Strongylose                 | E. cloacae + E. coli +<br>Enterocoque dans fèces,<br>os, rate           | Atrophie de la rate<br>Péritonite<br>Intestin hémorragique                                     |
| 74 746              | M       | Néant                                     | E. cloacae + E. coli<br>dans fèces                                      | Lièvre de terrain<br>Gaz dans l'intestin<br>Reins, rate congestionnés<br>Ulcère stomacal       |



| N° de l'animal | Sexe        | Parasitologie                                   | Bactériologie                                               | Symptômes et lésions                                                            |
|----------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 74 219         | M           | Néant                                           | E. cloacae dans rate, os, fèces                             |                                                                                 |
| 75 041         | F<br>Pleine | Coccidiose + +                                  | E. cloacae dans reins, foetus, fèces                        | Congestion hépatique<br>Intestin hémorragique<br>Splénomégalie                  |
| 75 109         | F           | Trichostrongylose                               | E. cloacae + E. coli dans utérus, fèces, foie               | Intestin hémorragique                                                           |
| 75 091         | M           | Néant                                           | E. cloacae + E. coli dans fèces                             | Splénomégalie<br>Début d'ictère<br>Intestin hémorragique<br>Reins congestionnés |
| 75 087         | M           | Trichostrongylose digestive massive             | E. cloacae et Pasteurella hemolytica dans le poulmon        | Poumons avec nodules blanchâtres et pus<br>Foie friable                         |
| 27             | Levraut     | Néant                                           | E. cloacae dans fèces                                       | Diarrhée                                                                        |
| 75 204         | M           | Strongylose digestive                           | E. cloacae + flore de putréfaction                          | Conjonctivite bilatérale<br>Hépatisation du poulmon                             |
| 76 001         | M           | Trichostrongylose                               | E. cloacae + E. coli + Pasteurella hemolytica dans poulmons | Pneumonie                                                                       |
| 76 003         | M           | Cysticercose<br>Coccidiose<br>Trichostrongylose | E. cloacae + E. coli dans os                                | Lièvre de terrain putréfié                                                      |



| N° de l'animal | Sexe | Parasitologie                         | Bactériologie                                      | Symptômes et lésions                              |
|----------------|------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 76 008         | M    | Coccidiose + + +<br>Strongylose + + + | E. cloacae<br>Pasteurella hemolytica               | Pneumonie                                         |
| 74 710         | F    | Coccidiose + + +<br>Strongylose + + + | E. cloacae + E. coli +<br>Enterocoque dans poumons | Pneumonie<br>Reins congestionnés<br>Splénomégalie |

T A B L E A U    I V



| N° de l'animal | Sexe              | Parasitologie                      | Bactériologie                                                        | Symptômes et lésions                                                                       |
|----------------|-------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 74 685         | F                 | Néant                              | E. hafniae dans foie                                                 | Splénomégalie<br>Foie dégénéré                                                             |
| 74 694         | Levraut           | Néant                              | E. hafniae dans fèces<br>et foie                                     | Péritonite localisée à une<br>partie de l'intestin nécro-<br>tico hémorragique : occlusion |
| 74 692         | F<br>Pleine       | Néant                              | E. hafniae associé à<br>flore multiple dans ovaires                  | Diarrhée hémorragique<br>Rate, foie congestionnés                                          |
| 73 527         | M                 | Coccidiose                         | E. hafniae + E. coli<br>Staphylocoque dans coeur,<br>fèces, poumon   | Congestion pulmonaire                                                                      |
| 74 697         | Levraut<br>2 mois | Néant                              | E. hafniae dans rate                                                 | Intestin hémorragique                                                                      |
| 74 733         | F                 | Strongylose                        | E. hafniae + E. cloacae<br>dans pus de l'oeil                        | Cécité<br>Conjonctivite purulente                                                          |
| 74 735         | M                 | Néant                              | E. hafniae + Welchia<br>perfringens + Yersinia<br>pseudotuberculosis | Lièvre de terrain<br>Ictère, splénomégalie<br>Intestin hémorragique                        |
| 75 061         | M                 | Trichostrongylose<br>Coccidiose    | E. hafniae + E. cloacae<br>+ E. coli dans rate, moelle,<br>fèces     | Intestin hémorragique                                                                      |
| 75 076         | F<br>Pleine       | Néant                              | E. hafniae du foetus                                                 | Intestin hémorragique,<br>reins mous, foie dégénéré ;<br>rate piquetée congestionnée       |
| 76 131         | M                 | Dicrocoeliose<br>Trichostrongylose | E. hafniae dans rate                                                 | Pneumonie purulente                                                                        |



#### 4) Identification biochimique :

Elle s'est adressée à la méthode API sur vingt caractères. Le système API 20 ENTEROBACTERIACAE est une galerie de vingt tubes permettant de rechercher vingt deux caractères biochimiques pour l'identification en dix huit à vingt quatre heures des Entérobactéries.

Les caractères d'*Enterobacter cloacae* par cette méthode sont les suivants :

*E. cloacae* : ONPG (+), ADH (+), LDC (-), ODC (+), CIT (+), H<sub>2</sub>S (-),  
 .....  
 Urée (-), TDA (-), IND (-), VP (+).  
 Gel (-), Glu (+), MAN (+), INO (-), SOR (+), RHA (+),  
 SAC (+), MEL (+), AMY (+), ARA (+), Oxydase (-), Nitrate (+).

*E. hafniae* : ADH (-), LDC (+), SOR (-), SAC (-), MEL (-), ONPG (+), ODC (+),  
 .....  
 CIT(+), H<sub>2</sub>S(-), Urée(-), TDA(-), IND(-), VP(±), Gel(-), Glu(+),  
 MAN(+), INO(-), RHA(+), AMY(+), ARA(+), Oxydase(-), Nitrate(+).

#### 5) Etude biochimique :

##### a) Métabolisme.

Le pouvoir fermentaire a été étudié grâce au système API 50 caractères (Tableau VI).

##### b) Sensibilité aux antibiotiques.

Elle a été réalisée selon la technique de l'Institut Pasteur, par la méthode des disques : quatre boîtes de Pétri contenant du milieu de Mueller-Hinton sont inondées avec une suspension bactérienne au 1/10 000. L'excédent de liquide étant éliminé, des disques imprégnés des antibiotiques appartenant aux familles suivantes :

-  $\beta$  lactamines : Pénicilline, Ampicilline, Céphalotine, Méthicilline, Oxacilline et Novobiocine ;

- Aminosides : Streptomycine, Kanamycine, Gentamycine, Néomycine, Tobramycine ;



- Chloramphénicol ;
- Tétracyclines : Tétracycline, Chlortétracycline, Oxytétracycline ;
- Macrolides : Erythromycine, Spiramycine, Oléandomycine, Lyncomycine, Rifampicine ;
- Polypeptides : Polymyxine, Colimycine ;

sont disposés dans les boîtes à raison de quatre ou cinq disques par boîte. La lecture est effectuée par mesure du diamètre de la zone d'inhibition.

#### 6) Pouvoir pathogène expérimental :

On injecte par voie intrapéritonéale 0,1 ml d'une culture d'Enterobacter en bouillon de dix huit heures à cinq souris (CF1) pesant 25 grammes environ, par souche.

## II. RESULTATS.

-----

#### 1) Morphologie et caractères cultureux :

Les souches présentent une morphologie classique : bacilles courts, non sporulés, mobiles et non capsulés.

Sur gélose ordinaire et gélose au sang, les colonies ressemblent à celles des entérobactéries. Il a été noté parfois des colonies sèches, voire ridées, difficiles à prélever à l'anse de platine et laissant leur empreinte sur les milieux gélosés ; des colonies très sèches, en chou-fleur ; des colonies muqueuses et confluentes, en particulier sur les milieux renfermant des sucres fermentescibles.

Les souches d'Enterobacter isolées se sont révélées non hémolytiques.



| N° | Substrats            |      | Réactifs à ajouter | Objet de la recherche | Réaction positive | Réaction négative |
|----|----------------------|------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 0  | rouge de phénol      | (PR) | Néant              | Témoin                | Rouge             |                   |
| 1  | glycérol             | (PR) | Néant              | Acidification         | Jaune             | Rouge             |
| 2  | éритроthol           | (PR) | Néant              | Acidification         | Jaune             | Rouge             |
| 3  | d(-) arabinose       | (PR) | Néant              | Acidification         | Jaune             | Rouge             |
| 4  | l(+) arabinose       | (PR) | Néant              | Acidification         | Jaune             | Rouge             |
| 5  | ribose               | (PR) | Néant              | Acidification         | Jaune             | Rouge             |
| 6  | d(+) xylose          | (PR) | Néant              | Acidification         | Jaune             | Rouge             |
| 7  | l(-) xylose          | (PR) | Néant              | Acidification         | Jaune             | Rouge             |
| 8  | adonitol             | (PR) | Néant              | Acidification         | Jaune             | Rouge             |
| 9  | méthyl-xyloside      | (PR) | Néant              | Acidification         | Jaune             | Rouge             |
| 10 | galactose            | (PR) | Néant              | Acidification         | Jaune             | Rouge             |
| 11 | d(+) glucose         | (PR) | Néant              | Acidification         | Jaune             | Rouge             |
| 12 | d(-) lévulose        | (PR) | Néant              | Acidification         | Jaune             | Rouge             |
| 13 | d(+) mannose         | (PR) | Néant              | Acidification         | Jaune             | Rouge             |
| 14 | l(-) sorbose         | (PR) | Néant              | Acidification         | Jaune             | Rouge             |
| 15 | rhamnose             | (PR) | Néant              | Acidification         | Jaune             | Rouge             |
| 16 | dulcitol             | (PR) | Néant              | Acidification         | Jaune             | Rouge             |
| 17 | méso-inositol        | (PR) | Néant              | Acidification         | Jaune             | Rouge             |
| 18 | mannitol             | (PR) | Néant              | Acidification         | Jaune             | Rouge             |
| 19 | sorbitol             | (PR) | Néant              | Acidification         | Jaune             | Rouge             |
| 20 | méthyl-d-mannoside   | (PR) | Néant              | Acidification         | Jaune             | Rouge             |
| 21 | méthyl-d-glucoside   | (PR) | Néant              | Acidification         | Jaune             | Rouge             |
| 22 | N acétyl-glucosamine | (PR) | Néant              | Acidification         | Jaune             | Rouge             |
| 23 | amygdaline           | (PR) | Néant              | Acidification         | Jaune             | Rouge             |



| N° | Substrats          |          | Réactifs à ajouter | Objet de la recherche   | Réaction positive | Réaction négative |
|----|--------------------|----------|--------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 24 | arbutine           | citrate  | Néant              | Acidification-réduction | Jaune-noir        | Rouge             |
| 25 | Esculine           | Fer (PR) |                    | Réduction               | Noir              | Rouge             |
| 26 | Salicine           | (PR)     | Néant              | Acidification           | Jaune             | Rouge             |
| 27 | d(+) Cellobiose    | (PR)     | Néant              | Acidification           | Jaune             | Rouge             |
| 28 | Maltose            | (PR)     | Néant              | Acidification           | Jaune             | Rouge             |
| 29 | Lactose            | (PR)     | Néant              | Acidification           | Jaune             | Rouge             |
| 30 | d(+) Maltibiose    | (PR)     | Néant              | Acidification           | Jaune             | Rouge             |
| 31 | Saccharose         | (PR)     | Néant              | Acidification           | Jaune             | Rouge             |
| 32 | Tréhalose          | (PR)     | Néant              | Acidification           | Jaune             | Rouge             |
| 33 | Inuline            | (PR)     | Néant              | Acidification           | Jaune             | Rouge             |
| 34 | d(+) Mélézitose    | (PR)     | Néant              | Acidification           | Jaune             | Rouge             |
| 35 | d(+) Raffinose     | (PR)     | Néant              | Acidification           | Jaune             | Rouge             |
| 36 | Dextrine           | (PR)     | Néant              | Acidification           | Jaune             | Rouge             |
| 37 | Amylose            | (PR)     | Néant              | Acidification           | Jaune             | Rouge             |
| 38 | Amidon             | (PR)     | Néant              | Acidification           | Jaune             | Rouge             |
| 39 | Glycogène          | (PR)     | Néant              | Acidification           | Jaune             | Rouge             |
| 40 | O.N.P.G.           | (PR)     | Néant              | Acidification           | Jaune             | Rouge             |
| 41 | Arginine           | (PR)     | Néant              | Bêta-galactosidase      | Jaune             | Incolore          |
| 42 | Lysine             | (PR)     | Néant              | Arginine-dihydrolase    | Rouge             | Jaune             |
| 43 | Ornithine          | (PR)     | Néant              | Lysine-décarboxylase    | Rouge             | Jaune             |
| 44 | Citrate de sodium  |          | Néant              | Ornithine-décarboxylase | Rouge             | Jaune             |
| 45 | Thiosulfate de fer |          | Néant              | Assimilation (Simmons)  | Bleu              | Vert              |
| 46 | Urée               | (PR)     | Néant              | H <sub>2</sub> S        | Noir              | Incolore          |
| 47 | Tryptophanne       |          | Néant              | Uréase                  | Rouge             | Jaune             |
|    |                    |          | Perchlorure de fer | Désamination            | Brun              | Jaune             |



| N° | Substrats           |  | Réactifs à<br>ajouter  | Objet de la recherche | Réaction<br>positive | Réaction<br>négative |
|----|---------------------|--|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 48 | Tryptophane peptone |  | Kovacs                 | Indole                | Anneau<br>rouge      | Anneau<br>jaune      |
| 49 | Acide pyruvique     |  | Potasse +<br>a Naphtol | Acétoïne              | Rouge vif            | Incolore             |

T A B L E A U   VI

LISTE DES CARACTERES BIOCHIMIQUES



## 2) Etude biochimique approfondie :

### a) Enterobacter cloacae

Elle se traduit par la mise en évidence de :

- Douze caractères constamment positifs :

d(+) Glucose, Ribose, d(+) Xylose, Rhamnose, d(+) Mélibiose,  
d(+) Raffinose, Galactose, ONPG, ADH, ODC, Citrate de Sodium, VP.

- Seize caractères variants :

Glycérol, l(+) Arabinose, d(-) Levulose, d(+) Mannose, Meso-inositol,  
Mannitol, Sorbitol, Méthyl-d-Glucoside, N Acétyl-Glucosamine,  
Amygdaline, Esculine, d(+) Cellobiose, Maltose, Lactose, Saccharose,  
d(-) Tréhalose,

(Tableau VII).

- Vingt et un caractères constamment négatifs :

d(-) Arabinose, Erythritol, l(-) Xylose, Adonitol, Méthyl-xyloside,  
l(-) Sorbose, Dulcitol, d(+) Mélézitose, Méthyl-d-Mannoside, Arbutine,  
Salicine, Inuline, Dextrine, Amylose, Amidon, Glycogène, LDC, H<sub>2</sub> S,  
Urée, Indole, TDA.

### b) Enterobacter hafniae

Elle se traduit par la mise en évidence de :

- Treize caractères constamment positifs :

l(+) Arabinose, Ribose, d(+) Xylose, Galactose, d(+) Glucose,  
d(-) Levulose, d(+) Mannose, N Acéthyl-glucosamine, d(+) Raffinose,  
Ornithine, d(-) Tréhalose, Mannitol, Sorbitol.



| CARACTERES            | LIEVRES (30) | POURCENTAGE |
|-----------------------|--------------|-------------|
| Glycérol              | 13           | 43          |
| l(+) arabinose        | 26           | 87          |
| d(-) levulose         | 25           | 83          |
| d(+) mannose          | 28           | 93          |
| Meso inositol         | 6            | 20          |
| Mannitol              | 24           | 80          |
| Sorbitol              | 26           | 87          |
| Methyl-d-glucoside    | 22           | 73          |
| N-Acéthyl-glucosamine | 25           | 83          |
| Amygdaline            | 1            | 3,3         |
| Esculine              | 20           | 67          |
| d(+) cellobiose       | 23           | 77          |
| Maltose               | 25           | 83          |
| Lactose               | 16           | 53          |
| Saccharose            | 24           | 80          |
| d(-) tréhalose        | 26           | 87          |

TABLEAU VII

Caractères biochimiques variants  
des souches d'Enterobacter cloacae



- Seize caractères variants :

Glycérol, d(-) Arabinose, l(-) Xylose, Méthyl-Xyloside, Rhamnose, Méthyl-d-mannoside, Méthyl-d-glucoside, Maltose, Lactose, d(+) Mélibiose, Saccharose, ADH, LDC, Citrate de Sodium, VP, ONPG.

(Tableau VIII).

- Vingt et un caractères constamment négatifs :

Adonitol, Erythritol, l(-) Sorbose, Dulcitol, Meso-inositol, Amygdaline, Arbutine, Esculine, Salicine, d(+) Cellobiose, Inuline, d(+) Mélézitose, Dextrine, Amylose, Amidon, Glycogène, H<sub>2</sub> S, Urée, Indole, TDA.

3) Etude de la sensibilité aux antibiotiques :

On constate :

En ce qui concerne *Enterobacter cloacae* :

- la sensibilité de la plupart des souches aux antibiotiques suivants : Kanamycine, Gentamycine, Colimycine, Sulfamide.

- la résistance de toutes les souches à : Novobiocine, Pénicilline, Ampicilline, Spiramycine, Erythromycine,

- le caractère intermédiaire de toutes les souches à : Tétracycline, Chloramphénicol, Streptomycine, Céfalogène.

(Tableau IX).

Pour *Enterobacter hafniae*, on note :

- la sensibilité au Chloramphénicol, Sulfamide, Kanamycine,

- la résistance de toutes les souches à la Pénicilline, Spiramycine, Erythromycine, Colimycine, Polymyxine, Novobiocine, Tétracycline,



- le caractère intermédiaire de toutes les souches à l'Ampicilline, Céfalogine, Streptomycine, Néomycine, Gentamycine.

(Tableau X).

4) Etude du pouvoir pathogène expérimental :

Dix sept souches sur quarante seulement tuent la souris après inoculation par voie intrapéritonéale, après un temps d'incubation qui varie entre dix-huit heures jusqu'à soixante heures après l'inoculation, le germe étant réisolable de la rate des cadavres.

(Tableau XI).




| CARACTERES         | LIEVRES (10) | POURCENTAGE |
|--------------------|--------------|-------------|
| Glycérol           | 6            | 60          |
| d(-) arabinose     | 5            | 50          |
| l(-) xylose        | 1            | 10          |
| Méthyl-d-mannoside | 1            | 10          |
| Méthyl-d-glucoside | 2            | 20          |
| Maltose            | 7            | 70          |
| Lactose            | 6            | 60          |
| d(+) mélibiose     | 5            | 50          |
| Saccharose         | 2            | 20          |
| Arginine           | 4            | 40          |
| Lysine             | 3            | 30          |
| Citrate de Sodium  | 5            | 50          |
| Méthyl-xyloside    | 1            | 10          |
| Rhamnose           | 7            | 70          |
| Acide pyruvique    | 7            | 70          |
| O.N.P.G.           | 7            | 70          |

TABLEAU VIII


Caractères biochimiques variants  
des souches d'Enterobacter hafniae



E. cloacae



E. hafniae



PROFILS MOYENS

de E. CLOACAE et E. HAFNIAE



|                 | Nombre souches<br><u>sensibles</u> | Nombre souches<br><u>intermédiaires</u> | Nombre souches<br><u>résistantes</u> |
|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Penicilline     | 0                                  | 6                                       | 22                                   |
| Ampicilline     | 0                                  | 10                                      | 18                                   |
| Cefalotine      | 0                                  | 16                                      | 12                                   |
| Streptomycine   | 13                                 | 15                                      | 0                                    |
| Kanamycine      | 23                                 | 2                                       | 3                                    |
| Néomycine       | 17                                 | 10                                      | 1                                    |
| Gentamycine     | 19                                 | 9                                       | 0                                    |
| Chloramphénicol | 12                                 | 16                                      | 0                                    |
| Tétracycline    | 5                                  | 23                                      | 0                                    |
| Spiramycine     | 0                                  | 2                                       | 26                                   |
| Erythromycine   | 0                                  | 0                                       | 28                                   |
| Colimycine      | 19                                 | 3                                       | 5                                    |
| Polymyxine      | 13                                 | 0                                       | 15                                   |
| Sulfamide       | 26                                 | 0                                       | 2                                    |
| Novobiocine     | 0                                  | 0                                       | 28                                   |

TABLEAU IX

Antibiosensibilité des souches

d'*Enterobacter cloacae*

(28 souches)



|                 | <u>Souches<br/>sensibles</u> | <u>Souches<br/>intermédiaires</u> | <u>Souches<br/>résistantes</u> |
|-----------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Pénicilline     | 0                            | 0                                 | 9                              |
| Ampicilline     | 2                            | 5                                 | 2                              |
| Céfalotine      | 2                            | 5                                 | 2                              |
| Streptomycine   | 3                            | 5                                 | 1                              |
| Kanamycine      | 5                            | 3                                 | 1                              |
| Néomycine       | 1                            | 8                                 | 0                              |
| Gentamycine     | 3                            | 6                                 | 0                              |
| Chloramphénicol | 9                            | 0                                 | 0                              |
| Tétracycline    | 1                            | 2                                 | 6                              |
| Spiramycine     | 0                            | 0                                 | 9                              |
| Erythromycine   | 0                            | 0                                 | 9                              |
| Colimycine      | 1                            | 0                                 | 8                              |
| Polymyxine      | 3                            | 0                                 | 6                              |
| Sulfamide       | 9                            | 0                                 | 0                              |
| Novobiocine     | 0                            | 0                                 | 9                              |

TABLEAU X

Antibiosensibilité des souchesd'Enterobacter hafniae

(9 souches)



| N° de l'animal | Lieu de l'isolement  | Nombre de souches | Pouvoir pathogène sur souris |
|----------------|----------------------|-------------------|------------------------------|
| 74 643         | Rate                 | 1                 | -                            |
|                | Foie                 | 1                 | -                            |
| 74 644         | Rein, poumon         | 1                 | -                            |
| 73 566         | Rein                 | 1                 | -                            |
| 74 695         | Fèces                | 1                 | + : 18h, 37h                 |
| 74 692         | Ovaire               | 1                 | -                            |
| 74 632         | Poumon               | 1                 | + : 32h                      |
| 74 715         | Surrénale            | 1                 | + : 22h, 46h                 |
| 74 717         | Pus de l'oeil        | 1                 | -                            |
| 74 718         | Jetage               | 1                 | -                            |
| 74 682         | Rate                 | 1                 | + : 18h                      |
| 1 051(1)       | Rate                 | 1                 | -                            |
| 1 051(2)       | Rate                 | 1                 | -                            |
| H 12 891       | Fèces                | 1                 | -                            |
| 74 734         | Poumon, foie         | 1                 | + : 28h, 32h                 |
| 74 736         | Fèces, os            | 1                 | + : 20h, 40h                 |
| 74 737         | Fèces, rate, foie    | 1                 | + : 18h, 38h                 |
| 74 740         | Fèces, os, rate      | 1                 | + : 18h, 50h                 |
| 74 746         | Fèces                | 1                 | -                            |
| 74 219         | Rate                 | 1                 | + : 10h, 40h                 |
| 75 091         | Fèces                | 1                 | + : 24h, 44h                 |
| 75 087         | Poumon               | 1                 | -                            |
| 27             | Fèces                | 1                 | + : 18 h                     |
| 75 204         | Os                   | 1                 | -                            |
| 76 001         | Poumon               | 1                 | -                            |
| 76 003         | Os, rate             | 1                 | -                            |
| 74 685         | Foie, poumon         | 1                 | -                            |
| 74 694         | Fèces, foie          | 1                 | + : 18h, 42h                 |
| 74 692         | Ovaire               | 1                 | + : 42h, 60h                 |
| 73 527         | Coeur, fèces, poumon | 1                 | -                            |
| 74 710         | Poumon               | 1                 | -                            |
| 74 697         | Rate                 | 1                 | -                            |
| 74 733         | Pus de l'oeil        | 1                 | + : 18 h                     |



| N° de l'animal | Lieu de l'isolement | Nombre de souches | Pouvoir pathogène sur souris |
|----------------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| 74 735         | Rate                | 1                 | + : 25 h                     |
| 75 081         | Rate, os            | 1                 | -                            |
| 75 076         | Foetus              | 1                 | -                            |
| 75 041         | Rein, fèces         | 1                 | + : 18 h                     |
| 75 109         | Utérus, foie, fèces | 1                 | -                            |
| 76 008         | Rate                | 1                 | -                            |
| 76 131         | Rate                | 1                 | + : 18 h                     |

TABLEAU XI

Pouvoir pathogène expérimental

des souches d'Enterobacter



D I S C U S S I O N  
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-



## I. BIOCHIMIE.

-----

Les souches isolées chez le lièvre présentent tous les caractères d'*Enterobacter cloacae* et d'*Enterobacter hafniae* :

- la production de gaz lors de la fermentation du glucose,
- l'absence d'uréase et d'indole,
- la production d'acéthyl-méthyl-carbinol.

M. VERON et L. Le MINOR (82) classent les souches d'*Enterobacter cloacae* dans le groupe des *Klebsiella* dystrophiques (qui n'utilisent en moyenne que  $30,0 \pm 3,2$  substrats) et celles d'*Enterobacter hafniae* dans le groupe des *Klebsiella* eutrophiques (utilisant  $49,5 \pm 7,0$  substrats en moyenne).

Les souches qu'ils ont étudiées utilisent une moyenne de 35 substrats différents. Un certain nombre d'entre eux (sucres, acides carboxyliques, amines, acides aminés) permettent le diagnostic différentiel des diverses espèces d'entérobactéries dont *Enterobacter cloacae* et *Enterobacter hafniae* (Tableau XII).

L'étude comparative des souches d'*Enterobacter hafniae* indique la fermentation du sorbitol et du raffinose par toutes les souches ainsi qu'une fermentation variable du saccharose et du mélibiose.

C. RICHARD (71) lors d'une étude portant sur quatre cents souches d'*Enterobacter hafniae* (dont six ont été isolées à partir de lièvres) note que 1 % seulement d'entre elles utilisent le sorbitol et le saccharose alors qu'aucune n'est capable de fermenter le raffinose et le mélibiose.

66 % des souches d'*Enterobacter hafniae* étudiées fermentent le lactose. Ce pourcentage des souches lactose positif est très supérieur à celui trouvé par le même auteur (5 %), et l'on peut se demander si ce caractère atypique est porté par un plasmide comme l'ont montré L. Le MINOR et C. COYNAULT (44). L'étude du transfert spontané de ce caractère à des souches d'*E. coli* ou de *S. typhi* n'a pas été tentée.



|                        | Enterobacter cloacae |                | Enterobacter hafniae |                |
|------------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
|                        | VERON<br>(76)        | NOTRE<br>ETUDE | VERON<br>(76)        | NOTRE<br>ETUDE |
| Sucres et alcool :     |                      |                |                      |                |
| D ribose               | +                    | +              | +                    | +              |
| D xylose               | +                    | +              | +                    | +              |
| L rhamnose             | +                    | +              | 1/4                  | 7/10           |
| D mannose              | +                    | 29/30          | +                    | +              |
| D saccharose           | +                    | 24/30          | -                    | 2/10           |
| D mannitol             | +                    | 24/30          | +                    | +              |
| D sorbitol             | 7/8                  | 26/30          | -                    | +              |
| Acides carboxyliques : |                      |                |                      |                |
| Perlagonate            | -                    |                | -                    |                |
| Caprate                | -                    |                | 1/4                  |                |
| Lactate                | 7/8                  |                | +                    |                |
| Citrate                | +                    | +              | 1/4                  | 5/10           |
| Phényl acétate         | 6/8                  |                | +                    |                |
|                        | 8 souches            | 30 souches     | 4 souches            | 10 souches     |

TABLEAU XII

Diagnostic différentiel par substrats

de E. cloacae et E. hafniae



## II. ANTIBIOSENSIBILITE.

-----

Si nous comparons l'antibiosensibilité des souches isolées chez l'homme avec l'antibiosensibilité des souches isolées chez le lièvre, nous constatons pour ces dernières une résistance supérieure aux divers antibiotiques testés.

En effet, les macrolides (spiramycine en particulier) et les  $\beta$  lactamines (Pénicilline, Ampicilline, Céfalogline) se sont révélés sans action.


En ce qui concerne les autres antibiotiques à part la sensibilité au Chloramphénicol, à la Kanamycine et aux sulfamides, les autres antibiotiques habituellement utilisés pour le traitement des affections à Gram négatif ont présenté une activité très variable selon la souche testée.

Dans notre étude quatre souches d'*Enterobacter cloacae* présentent une multirésistance au Chloramphénicol, à la Tétracycline, à la Streptomycine et aux sulfamides. Cette multirésistance est semblable à celle portée par le plasmide de la souche d'*Enterobacter cloacae* DF 13 décrit et étudié par ZANDVLIET et JANSZ (83). Ces auteurs ont montré que ce plasmide était transmissible et avait un poids moléculaire de  $6.10^6$ .

Les souches que nous avons étudiées portent-elles un plasmide identique ? Il peut paraître vraisemblable que ces bactéries, responsables d'une transmission à d'autres souches d'une polyrésistance, entraînent une pathogénicité de ces germes jusqu'alors inoffensifs.

Il conviendrait de penser à l'importance jouée par l'antibiosupplémentation d'utilisation courante dans l'élevage du lièvre, afin d'éviter l'apparition du cycle épidémiologique suivant :





### III. POUVOIR PATHOGENE.

-----

L'inoculation intrapéritonéale à la souris se traduit par un syndrome hémorragique et septicémique pour la majorité des souches qui ont provoqué la mort des souris.



Il est toutefois difficile de juger du pouvoir pathogène des *Enterobacter*. A l'heure actuelle, il ne semble pas que cette espèce sécrète des entérotoxines comme *E. coli*.

Il aurait été utile de contrôler l'entéropathogénicité des souches isolées par la technique des anses intestinales (12-52).

Il conviendrait cependant de rechercher la présence de plasmide Ent + et d'analyser l'information génétique portée par des particules extrachromosomiques chez cette espèce.

En effet, germe saprophyte largement répandu dans la nature, les *Enterobacter* peuvent constituer un réservoir de bactéries polyrésistantes capables de contaminer l'homme et les animaux.

#### IV. PROPHYLAXIE.

-----

La difficulté de la mise en place d'une vaccination, tant que cette étude n'aura pas été poursuivie, engage au contrôle hygiénique et sanitaire de l'élevage, afin d'éviter toute déficience organique.

Le déparasitage et l'alimentation exigent une surveillance constante, à étendre aux sujets d'importation, sous réserve que leur mise en condition préalable au lâcher ne constitue pas une agression en elle-même.

En réalité, deux constantes paraissent se dégager des études sur la pathologie des lièvres d'élevage :

- d'une part, la prééminence de la qualité de l'éleveur qui doit être l'observateur attentif et l'infirmier méticuleux de son exploitation,

- d'autre part, l'importance numérique de l'élevage, avec délimitation d'un seuil en-deça duquel les problèmes pathologiques demeurent mineurs, au-delà duquel la densification, même en cages bien séparées, hypothèque la rentabilité de la production.



CONCLUSIONS  
-:-:-:-:-



I. Les Enterobacter sont des bactéries Gram négatives, aéro-anaérobies, mobiles par une ciliature péritriche, qui cultivent aisément sur les milieux ordinaires. Le citrate et l'acétate sont utilisés comme seule source de carbone.

A 37° C, le glucose fermente en s'accompagnant d'une production d'Acide et de Gaz ( $\text{CO}_2$ , H).

A 44° C, le gaz n'est pas produit à partir de glucose. Le Dulcitol n'est pas attaqué. Le test de méthyl rouge est négatif.

II. Germes saprophytes "profiteurs d'occasions", largement répandus dans la nature, les Enterobacter se rencontrent dans les égoûts, divers produits alimentaires, même dernièrement dans les épices. Trouvés dans les selles humaines et animales, le sol, à l'occasion dans l'urine, le pus et autres matériaux pathologiques provenant d'animaux, leur isolement devient de plus en plus fréquent lors de septicémies ou d'infections localisées diverses (avortements, entérites, infection urinaire, péricardite).

III. L'isolement chez les lièvres de trente souches d'Enterobacter cloacae et de dix souches d'Enterobacter hafniae est rapporté.

IV. La recherche de la sensibilité aux antibiotiques a révélé la grande résistance de ces souches à la Pénicilline, Spiramycine, Erythromycine, Novobiocine et Ampicilline.

En revanche, soulignons leur sensibilité au Chloramphénicol, à la Kanamycine, Gentamycine, Colimycine, enfin aux Sulfamides.



V. Le pouvoir pathogène des souches est difficile à caractériser.  
Par suite, il nous semble que ces Enterobacter "profiteurs d'occasions" expriment leur virulence sous l'action de facteurs adjuvants et prédisposants, en particulier des sujets présentant un état de :

- moindre résistance, comme les malades des services de soins intensifs ou les nouveau-nés,

- lors d'une faillite dans la barrière microbiologique intestinale.

<><><><>

Vu :  
LE DIRECTEUR  
de l'École Nationale Vétérinaire de Lyon,

LE PROFESSEUR RESPONSABLE  
de l'École Nationale Vétérinaire,

Vu :  
~~LE DOYEN,~~

LE PRÉSIDENT DE LA THÈSE,

Vu et permis d'imprimer

LYON, le ..... 19  
LE RECTEUR, PRÉSIDENT DU ~~CONSEIL~~ DE L'UNIVERSITÉ

D. GERMAIN

LYON I







1. ANSORG R., THOMSEN R. et STUBBE P.  
Erwinia species bei letaler Neugeborenenensepsis.  
Med. Microbiol. Immunol. 1974, 159, 161-170.
2. ARM H.G., FLOYD T.M., FABER J.E., et HAYES J.R.  
Use of ligated Segments of rabbit small intestine in experimental shigellosis.  
I. Path. Bact., 1965, 89, 803.
3. BARONE R., PAVAUX L., BLIN P.C., et CUQ P.  
Atlas d'anatomie du lapin.  
Masson éd., Paris 1973.
4. BEIJERINCK M.W.  
Schevefelwasserstoffbielung in den Stabtgraben und aufstellung der Gattung Aerobacter.  
Zentl. Bakt. H Abt, 1900, 6, 193.
5. BERGEYS  
Description of the species of genus Enterobacter.  
8ème édition, 324-326.
6. BOUVIER G. et collaborateurs  
Monographie des maladies du lièvre en Suisse.  
Service Vétérinaire cantonal et Institut Galli-Vallerio. Lausanne, 1951.
7. CHAREYRE G.  
Contribution à l'étude des syndromes diarrhéiques à prédominance colibacillaire du lièvre.  
Thèse Doct. Vét. Lyon 1974.
8. CHESTER F.D.  
A manual of determinative bacteriology.  
New York : the Mac Millan Co, 1901, p. 235.
9. CHOPIN A., DUCLUZEAU R., RAIBAUD P.  
Effet du régime alimentaire sur l'équilibre entre 14 souches microbiennes ensemencées dans le tube digestif de souris axéniques adultes et sur l'établissement de ces souches chez leurs descendants entre la naissance et le sevrage.  
Canad. J. Microbiol. 1974, 20, 1331-1339.
10. COLASSON Ch.  
Taux de reproduction des lièvres en captivité, influence de l'alimentation et du parasitisme.  
Thèse Doct. Vét. Toulouse 1972.
11. COTTEREAU P., BUISSIÈRE J., et SAINT AUBERT G. de  
La colibacillose du veau.  
Bull. Soc. Sci. Vét. comp. Lyon, 1967, 69, 6, 501-532.



12. DE S. N. et CHATTERJE D.M.  
Experimental study of the mechanism of action of vibris cholerae in the intestinal muccus membrane.  
J. Path. Bact. 1953, 66, 559.
13. DEWAELE A.  
Ecologie et élevage du porc.  
Ann. Med. Vét. 1971 T. 116, 529.
14. DUCLUZEAU R., DUBOS, MARTINET L. et RAIBAUD P.  
La flore microbienne du tractus digestif du levraut sain et diarrhéique :  
Communication personnelle.
15. DUCLUZEAU R., RAIBAUD P.  
Ensemencement de douze souches bactériennes dans le tube digestif de souris axéniques.  
I. Etude cinétique de l'implantation et de l'équilibre obtenu dans les fèces des souris "gnotoxéniques".  
Ann. Inst. Pasteur, 1969, 116, 345-369.
16. DUCLUZEAU R., RAIBAUD P., LADIRE M., RIOTTOT M., CHOPIN A.  
Etablissement de dix souches de bactéries anaérobies strictes dans le tube digestif de souris et de rats "gnotoxéniques".  
Effet de l'animal-hôte et de son régime alimentaire.  
Ann. Microbiol. Inst. Pasteur, 1973, 124 B, 517-532.
17. DUCLUZEAU R., RAIBAUD P., LAUVERGEON B., GOUET Ph., RIOU Y., GRISCELLI C., GHNASSIA J.C.  
Immediate post-natal decontamination as a means of obtaining axenic animals and human infants.  
Canad. J. Microbiol. (à paraître).
18. DUHAMEL M., CUVELIER A., COUSIN J., et FOURNIER A.  
Septicémie et méningite néo-natale à *Levinea malonatica*.  
Nouv. Presse Méd., 1975, 4, 428.
19. DYE D.W.  
A taxonomic study of the genus *Erwinia*.  
2. The carotovora group.  
N.Z. J. Sci., 1969, 12, 81-97.
20. DYE D.W.  
A taxonomic study of the genus *Erwinia*.  
3. The herbicola group.  
N.Z. Sci., 1969, 12, 223-236.
21. EDWARDS P.R. et EWING W.H.  
Identification of Enterobacteriaceae (3 d ed.),  
Burges Publ. Co. Minneapolis 15 (Minn.) 1972.



22. EWING W.H. et DAVIS B.R.  
Biochemical characterization of *Citrobacter freundii* and *Citrobacter diversus*. US Department of Health, Education and Welfare.  
Public Health Service, Communicable Disease Center, Atlanta, 1971.
23. EWING W.H. et DAVIS B.R.  
Biochemical characterization of *Citrobacter diversus* (Burke) Werkman and Gillen, and designation of the neotype strain.  
Int. J. Syst. Bact. 1972, 22, 12-18.
24. EWING W.H. et FIFE M.A.  
*Enterobacter agglomerans* (Beijerinck) comb. nov. The *Herbolica-lathyri* bacteria.  
Int. J. syst. Bact., 1972, 22, 4-11.
25. EWING W.H. et FIFE M.A.  
Biochemical characterization of *Enterobacter agglomerans*.  
Communicable Disease Center, Atlanta, 1972.
26. EWING W.H., Mc WHORTER A.C., ESCOBAR M.R. et LUBIN A.H.  
*Edwardsiella*, a new genus of Enterobacteriaceae based on a new species *E. tarda*.  
Int. Bull. Bact. Nomencl., 1965, 15, 33-38.
27. FAUCONNIER B., CORMIER M. et FABIANI C.  
Le rôle pathogène de souches de *Levinea* isolées de dix produits pathologiques.  
Nouv. Presse Méd., 1974, 3, 2026-2027.
28. FELSBY M., MUNK-ANDERSEN G. et SIBONI K.  
Simultaneous contamination of transfusion blood with *Enterobacter agglomerans* and *Pseudomonas fluorescens* supposed from pilot tubes.  
J. Med. Microbiol. 1973, 6, 413-416.
29. GRAEVENITZ A.  
Recognition and differential diagnosis of *Erwinia herbicola* strains isolated in the hospital.  
Path. Microbiol. (Basel), 1971, 37, 84-88.
30. GRAEVENITZ A.  
*Erwinia* infection from environmental sources.  
J. Amer. Med. Ass. 1971, 216, 1485.
31. GROSS R.J., ROWE B., et EASTON J.A.  
Neonatal meningitis caused by *Citrobacter koseri*.  
J. Clin. Path. 1973, 26, 138-139.
32. GUINEE P.A.M. et WALKENBURG J.J.  
Diagnostic value of a *hafniae* specific bacteriophage.  
J. Bact., 1968, 96, 564.



33. GUITARD P.  
Repeuplement des chasses françaises en lièvres d'importation.  
Essais d'une prophylaxie.  
Thèse Doct. Vét. Toulouse 1971.
34. HAMON Y., RICHARD C. et PERON Y.  
Etude de la bactériocinogénie et de la lysogénie chez les *Levinea*.  
Ann. Microbiol. (Inst. Pasteur) 1974, 125 A, 35-44.
35. HAMON Y., et PERON Y.  
Individualisation de quelques nouvelles familles d'enterobactériocines.  
C.R. Acad. Sci. (Paris), 1963, 257, 309-311.
36. HORMAECHE E., EDWARDS P.R.  
A proposed genus *Enterobacter*.  
Int. Bull. Bact. Nomen. Taxon. 10, 71-74, 1960.
37. HORMAECHE E., EDWARDS P.R.  
Proposal for the rejection of the generic name *Cloaca Castellani* and Chalmers, and proposal of *Enterobacter* as a generic name with description of type species and of its type culture : with request for an opinion.  
Int. Bull. Nomen. Taxon. 10, 75-76, 1960.
38. JOUBERT L., DESCHANEL J.P., GASTELLU J.  
Fécondité et pathologie du lièvre d'importation en France.  
Rev. Med. Vét., Octobre 1971, 34, 947.
39. JOUBERT L. et OUDAR J.  
Une enzootie d'entérotoxémie colibacillaire du lièvre d'élevage en semi-liberté.  
Bull. Soc. Vét. Méd. comp. Lyon, 1973, 75, 281-287.
40. JUIF J.G., RICHARD C., LAVILLAUREIX J., BERLAND H., SCHNEEGANS P. et BEAUVAIS P.  
La méningite du nouveau-né à *Levinea malonatica*.  
Arch. franç. Pédiat., 1974, 31, 759-764.
41. KING B.M., et ADLER D.  
A previously undescribed group of *Enterobacteriaceae*.  
Amer. J. Clin. Path. 1964, 41, 230-232.
42. LAUVERGEON B., HAJERI H. et PAPIERNIK E.  
Césariennes axéniques pour déficits immunitaires congénitaux.  
Rev. franç. Gynéc., 1975, 70, 563-570.
43. LECLERC H.  
Etude biochimique d'*Enterobacteriaceae* pigmentés.  
Ann. Inst. Pasteur, 1962, 102, 726-741.



44. LE MINOR L., et COYNAULT C.  
Déterminisme plasmidique du caractère atypique "lactose positif" de *Enterobacter hafniae* et de *Proteus morganic*.  
Ann. Microbiol. (Inst. Pasteur), 1976, 127 A, 213-221.
45. LE MINOR L., CHALON A.M., et VERON M.  
Recherches sur la présence de l'antigène commun des Enterobacteriaceae (antigène Kunin) chez les *Yersinia*, *Levinea*, *Aeromonas* et *Vibrio*.  
Ann. Inst. Pasteur, 1972, 123, 761-774.
46. LE MINOR L.  
Le diagnostic de laboratoire des entérobactéries.  
Edit. de la Tourette (3ème edit.) 53-56, 123.
47. LUND M.S., MATSEN J.M. et BLAZEVIC D.J.  
Biochemical and antibiotic susceptibility studies of H<sub>2</sub>S negative *Citrobacter*.  
Appl. Microbiol., 1974, 28, 22-25.
48. MATSUMOTO H.  
Studies on the hafnia isolated from normal human.  
Jap. J. Microbiol. 1963, 7, 105-114.
49. MOON H.W., WHIPP S.C., ENGSTROM C.W. et BAETZ A.L.  
Response of rabbit ileal loop to cell free products from *Escherichia coli* entero-pathogenic for swine.  
J. infect. Dis., 1970, 121, 182.
50. MITCHEL D.O. et coll. 1975  
Survival of *Salmonella* and other indication microorganism.  
Conf. J. Microbiol. 21, 1420-1421.
51. NIELSEB N.O. et SAUTTER J.M.  
Infection of ligated intestinal loops with haemolytic *Escherichia coli* in the pig.  
Can. Vét. J. 1968, 9, 90-97.
52. OUDAR J., RICHARD Y., RENAULT L., GASTELLU J. et JOUBERT L.  
Etude bactériologique de 35 souches d'*Escherichia coli* isolées de syndromes entéritiques du lièvre d'importation ou d'élevage.  
Rev. Méd. vét. 1974, 125, 4, 449-468.
53. PIECHAUD M.  
Cours Institut Pasteur 1970-1971.
54. POPOFF M.  
Communication personnelle.
55. POPOFF M., RICHARD C.  
Antigènes somatiques et flagellaires des *Levinea malonatica*.  
Ann. Microbiol. (Inst. Pasteur) 1975 (sous presse).



56. PIEN F.D., MARTIN W.J., HERMANS P.E. et WASHINGTON J.A.  
Clinical and bacteriologic observations on the proposed species,  
*Enterobacter agglomerans* (the *Herbicola-lathyri* bacteria).  
Proc. Mayo Clin., 1972, 47, 739-745.
57. PILET Ch., BOURDON S.C., TOMA B., MARCHAL N.  
Bactériologie médicale et vétérinaire  
141-143, 152.
58. RAIBAUD P., DICKINSON A.B., SACQUET E., CHARLIER H. et MOCQUOT G.  
La microflore du tube digestif du rat.  
I. Techniques d'étude et milieux de culture proposés.  
Ann. Inst. Pasteur, 1966, 110, 568-590.
59. RAIBAUD P., DUCLUZEAU R., MULLER M.C., GHNASSIA J.C., VERON M.,  
GRISCELLI C.  
Evolution de la flore bactérienne fécale d'un enfant "hétéroxénique"  
élevé dans un isolateur.  
Essai de décontamination par antibiothérapie.  
Ann. Microbiol. (à paraître).
60. RAIBAUD P., DUCLUZEAU R., MOCQUOT G., GHNASSIA J.C., GRISCELLI C.,  
LAUVERGEON B.  
Données récentes sur la flore microbienne du tube digestif chez l'homme  
et les animaux monogastriques.  
Rev. franç. Gynéc. 1975, 70, 541-547.
61. RAMISSE et coll.  
Remarques sur le diagnostic des infections colibacillaires des nouveau-nés.  
Rev. Méd. vét. 1974, 140, 351.
62. RENAULT L.  
Le rôle du colibacille en pathologie porcine.  
Publication de Sandus, juin 1975 I.E.O.
63. RENAULT L. et coll.  
Diagnostic de la colibacillose du veau.  
Rev. Med. vét. 144, n° 4, Avril 1963, 315.
64. RENAULT L. et coll.  
Principaux sérotypes d'*Escherichia coli* isolées chez le porc en France  
(souches hémolytiques).  
Bull. Acad. vét., 38, Déc. 1965, 465.
65. RENAULT L., VAISSAIRE J., MAIRE C., LE BOURHIS F. et LABADIE J.P.  
Rôle d'*Escherichia coli* dans l'étiologie des diarrhées du lapin.  
Journ. Recher. Avic. et Cunic., déc. 1973.
66. RICHARD C.  
Le genre *Levinea* (famille des *Enterobacteriaceae*).  
Bull. Liaison Anc. Elèves Dipl. Inst. Pasteur, 1972, n° 54, 85-92.



67. RICHARD C.  
Une nouvelle espèce d'entérobactérie rencontrée en bactériologie médicale  
*Enterobacter agglomerans* (ex. *Erwinia herbicola*). Etude biochimique de  
205 souches.  
Ann. Biol. Clin. 1974, 32, 341-346.
68. RICHARD C., JOLY B., SINOT J., STOLERU G.H., POPOFF M.  
Etude de souches de *Enterobacter* appartenant à un groupe particulier  
proche de *E. aerogenes*.  
Ann. Microb. (Inst. Pasteur) 1976, 127 A., 545-548.
69. RICHARD C., BRISOU B., et LIOULT J.  
Etude taxonomique de *Levinea*. Nouveau genre de la famille des entérobac-  
téries.  
Ann. Inst. Pasteur, 1972, 122, 1137-1147.
70. RICHARD Y., KECK G., POPOFF M., DOMENEC E. et OUDARJ  
L'aéromonose des poissons tropicaux d'aquarium.  
A paraître.
71. RICHARD C. et ALONSO J.M.  
Une enterobactine méconnue : *Enterobacter hafniae*.  
Bull. Inst. Pasteur 1976, 74, 339-352.
72. SAINT-MARTIN B., DUCLUZEAU R., GHNASSIA J.C., GRISCELLI C. et LAUVERGEON B.  
Amélioration de la technologie des enceintes stériles permettant leur  
application en médecine et en chirurgie.  
Rev. Franç. Gynéc. 1970, 70, 585-593.
73. SAKAZAKI R.  
Studies on the *hafniae* group of *Enterobacteriaceae*.  
Jap. J. Med. Sci. Biol. 14, 223-241, 1961.
74. SAKAZAKI R.  
Studies on the *Asakusa* group of *Enterobacteriaceae*.  
(*Edwardsiella tarda*). Jap. J. Méd. Sci. Biol. 20, 205-212.
75. SANCHEZ-BUENAVENTURA J. et GARCIA-SABATIER J.F.  
Aspectos bioquímicos y lisotipia de la especie *Hafniae* (*Enterobacter*  
*hafniae*). Med. Esp., 1975, 73, 11-19.
76. SCHMIDT R.E. et coll.  
*Klebsiella* *Enterobacter*, infection in chimpanzé.  
Lab. anim. Sci. 1971, 21, n° 6, art. 1, 946.
77. SMITH H.W. et HALLS S.  
I. Observations by the ligated intestinal segment and oral inoculation  
methods on *Escherichia coli* infection in pigs, lambs and rabbits.  
II. Studies in *Escherichia coli* enterotoxin.  
J. Path. Bact. 1967, 93, 499 et 531.



78. SMITH H.W.

The bacteriology of alimentary tract of domestic animal suffering from *Escherichia coli* infection.  
Ann. N.Y. Acad. Sci. 1971, 176.

79. VAN DER WAHJ D.

Nécessité et possibilité de contrôler la flore microbienne de l'homme et des animaux.  
Forum Medici, 1974, 17, 66-75.

80. VANNIER G.

Contribution à l'étude de l'élevage du lièvre en captivité étroite.  
Alfort 1972.

81. VERON M.

Nutrition et taxonomie des Enterobacteriaceae et bactéries voisines.  
I. Méthodes d'étude des auxanogrammes.  
Ann. Microbiol. Inst. Pasteur, 1965, 126 A., 267-274.

82. VERON M. et LE MINOR L.

Nutrition et taxonomie des Enterobacteriaceae et bactéries voisines.  
II. Résultat d'ensemble et classification.  
III. Caractères nutritionnels et différenciation des groupes taxonomiques.  
Ann. Microbiol. Inst. Pasteur, 1975, 126 B, 111-124, 125-147.

83. ZANDVLIET G.M., JANSZ H.S.

Characterization and replication control of plasmids from *Ent. cloacae* DF 13.  
Eur. J. Biochem. 1976, 62, 439-449.

<><><><>



## TABLE DES MATIERES

**THE UNIVERSITY OF CHICAGO**

|                                                                                                                                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <u>INTRODUCTION</u>                                                                                                                                                                           | 1  |
| <u>PREMIERE PARTIE : Le genre ENTEROBACTER</u>                                                                                                                                                | 4  |
| I. Historique                                                                                                                                                                                 | 5  |
| II. Taxonomie                                                                                                                                                                                 | 8  |
| III. Caractères bactériologiques                                                                                                                                                              | 11 |
| 1) Morphologie et coloration                                                                                                                                                                  | 11 |
| 2) Culture                                                                                                                                                                                    | 11 |
| IV. Caractères biochimiques                                                                                                                                                                   | 11 |
| 1) Communs                                                                                                                                                                                    | 11 |
| 2) Différentiels                                                                                                                                                                              | 12 |
| V. Propriétés biologiques                                                                                                                                                                     | 13 |
| 1) Habitat et rôle pathogène                                                                                                                                                                  | 13 |
| 2) Pouvoir antigène.                                                                                                                                                                          | 13 |
| 3) Lysotypie                                                                                                                                                                                  | 14 |
| 4) Bactériocines                                                                                                                                                                              | 14 |
| <u>DEUXIEME PARTIE : Essais de détermination des caractères morphologiques, cultureux, biochimiques et du pouvoir pathogène de différentes souches de Enterobacter isolées chez le lièvre</u> | 15 |
| I. Matériel et méthodes                                                                                                                                                                       | 16 |
| 1) Souches étudiées                                                                                                                                                                           | 16 |
| 2) Isolement                                                                                                                                                                                  | 16 |
| 3) Etude morphologique                                                                                                                                                                        | 16 |
| 4) Identification biochimique                                                                                                                                                                 | 22 |
| 5) Etude biochimique                                                                                                                                                                          | 22 |
| 6) Pouvoir pathogène expérimental                                                                                                                                                             | 23 |
| II. Résultats                                                                                                                                                                                 | 23 |
| 1) Morphologie et caractères cultureux                                                                                                                                                        | 23 |
| 2) Etude biochimique approfondie                                                                                                                                                              | 27 |
| 3) Etude de la sensibilité aux antibiotiques                                                                                                                                                  | 29 |
| 4) Etude du pouvoir pathogène expérimental                                                                                                                                                    | 30 |



|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| <u>DISCUSSION</u> . . . . .        | 37     |
| I. Biochimie . . . . .             | 38     |
| II. Antibiosensibilité . . . . .   | 40     |
| III. Pouvoir pathogène . . . . .   | 41     |
| IV. Prophylaxie . . . . .          | 42     |
| <br><u>CONCLUSIONS</u> . . . . .   | <br>43 |
| <br><u>BIBLIOGRAPHIE</u> . . . . . | <br>46 |









